Les antiseptiques
Choix et techniques
(adulte/enfant>30 mois)

PEAU SAINE

Risques Infectieux bas

- Injection IM
- Injection IV
- Injection intra dermo
- Injection S/C
- Vaccin
- Prélèvement de sang

1 temps

1 passage

Bétadine alcoolique ®
(flacon orange)
ou
Chlorhexidine alcoolique ®
0.5%
ou
Alcool à 70 %

Risques intermédiaires

- Pose de CVP
- Pose de cathéter S/C
- Branchement / débranchement fistule
- Pose aiguille de Huber
- Ponction veineuse pour hémoculture

Absence de souillures visibles

2 temps

2 passages successifs de l'Antiseptique avec changement de compresse (stérile)

Bétadine alcoolique ®
ou
Chlorhexidine alcoolique® 0.5%

Présence de souillures visibles

Réfection pansement sur voie centrale (PICC &CCI) et voie périphérique

4 temps

Bétadine scrub
ou
savon doux liquide unidose

Rinçage :
Eau stérile/Sérum phy

Séchage par tamponnement

Bétadine alcoolique ®
ou
Chlorhexidine alcoolique®
0.5%

MUQUEUSE/PEAU LÉSÉE

Sondage urinaire à demeure, évacuateur et hétérosondage

Détersion :
Bétadine scrub®/
Savon doux liquide

Rinçage :
Eau réseau

Séchage :
serviette de toilette propre ou compresse stérile

Bétadine dermique ®
ou
Dakin 0.5%

Soin buccal

Détersion :
brossage dents

Rinçage :
Eau réseau

Bétadine bain de bouche ®(CI : chez enfant <6ans)
ou
Chlorhexidine®
bain de bouche

MATÉRIEL

- Connectiques: valve, bouchon, obturateur, rampe embout de flacon
- Collecteur à urine : robinet de vidange et site de prélèvement

Bétadine alcoolique ®
(flacon orange)
ou
Chlorhexidine alcoolique ®
0.5%
ou
Alcool à 70 %

NB : Pour l'enfant <30 mois cf. « Guide des bonnes pratiques de l'antisepsie chez l'enfant – SF2H 2007 »

<u>Contre indication formelle</u> de la Chlorhexidine alcoolique® si contact avec : œil, oreille, muqueuse et peau lésée.

ARlin Provence-Alpes Côte d'Azur