




Vaccination contre sars-cOV2

Mode d'emploi


Vaccin pfizer-bioNTECH Comirnaty®

- Conservation à - 80° c
- Décongélation dans une zone réfrigérée entre + 2° C et + 8° C
- Conservation = 5 jours



Retourner 10 fois le flacon décongelé avant utilisation
DELICATEMENT

Ne pas secouer le flacon → altération +++ du vaccin



Dilution

- Produit décongelé est blanc à blanc cassé
- Injecter dans le flacon 1,8 ml de Na CL 0,9%
- **Retirer 1,8 ml d'air du flacon**
 - Retourner **DELICATEMENT** le flacon 10 fois
 - **NE PAS SECOUER LE FLACON**
- Volume reconstitué = 2,25 ml
- Conservation à température ambiante : 6 heures
- Seringue de 2ml + aiguille 21 ou 22G

Vaccination

- Dose pour une injection : 0,3 ml
- 5 doses par flacon
- Ne pas prélever plus de 5 doses par flacon
- Noter sur le flacon date et heure de préparation



- Prélever la dose dans une seringue de 1ml
- **NE PAS TAPOTER LA SERINGUE** pour enlever les bulles d'air
- Injecter dans le deltoïde : INTRA MUSCULAIRE
- Pas de pli cutané
- Aiguille « orange » 25G ou « bleue » 23G



- Alcool 60° pour désinfection des bouchons
- Alcool 60° pour asepsie de la peau
- Matériel pour préparation et injection : Aiguilles et seringues, compresses, alcool 60° (Pas de povidone iodée dermique)
- Précautions standards : Lavage des mains - solution hydro-alcoolique - masque - gants non obligatoires
- DASRI : aiguilles