

Vaccination contre la Covid-19 et antécédents allergiques.

Résumé des recommandations Françaises (SFA/FFAL/CNP allergologie) sur la conduite à tenir

<i>Manifestations allergiques</i>	<i>Conseil pour la vaccination</i>	<i>Durée de surveillance après vaccination</i>	<i>Conduite à tenir spéciale</i>
Antécédent d'allergie à un des composants du vaccin , en particulier aux polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates	Contre indiqué	Non vacciné	Adresser en allergologie
Antécédent de réaction immédiate^{1,2} à une première injection d'un vaccin ARNm COVID 19	Contre indiqué	Non vacciné	Adresser en allergologie
Antécédent de réaction immédiate^{1,2} à un autre vaccin ou à un médicament non identifié	Surseoir	Vacciné après avis d'expert	Adresser en allergologie
Toute autre antécédent allergique	Vaccination normale	15 à 30 minutes	

- Les recommandations précisent que les antécédents de réactions allergiques :
 - Au venin d'hyménoptères (abeille, guêpe, frelon)
 - Aux allergies alimentaires

Quelle que soit leur sévérité ne sont pas une contre-indication à la vaccination.

- Les allergies à relever pouvant contre indiqué une vaccination sont celles avec des médicaments contenant du POLYETHYLENE GLYCOL ou du POLYSORBATE.

Ce sont :

- Les laxatifs osmotiques : macrogol, transipeg, etc....
- Le polysorbate : Fluisedal, Prorhinel, Fortimel, Lansoprazole,